

Journal

Sagsansvarlig dyrlæge

Modtaget dato

Udtaget dato

Besvaret dato

CHR-nr:

Dyrlæge

Laboratoriesvar

Materiale: 25 Maver fra slagtesvin

Anamnese: USK på maver fra slagtesvin.

Konklusion:

6 ud af 25 dyr havde mavesår i udtalt grad, index 8.

6 ud af 25 dyr havde ar i udtalt grad, index 8 eller derover.

Bemærkninger:

Undersøgelser:

USK maver. Se vedlagte skemaer.

1580,00 kr. (ekskl. moms)

Kopi til:

Slagteri:

Lev. nr.:

Slagtedato:

Id	Forhorning	Erosion	Sår	Ar	Striktur	Sår Index	Ar Index
10	3		3	3	1	8	9
4	2		3	3	1	8	9
7	2		2	3	1	7	9
19	2		2	3	1	7	9
1	2		3	3		8	8
24	2	1		3		4	8
21	2		3	2		8	7
2	2		3	2		8	7
13	1		3	2		8	7
23	2		2	2		7	7
18	2		1	2		6	7
9	2	3	1	1		6	6
8	2	2		1		5	6
16	2			1		2	6
15	2	1	1			6	0
11	2	1				4	0
14	1	1				4	0
22	2					2	0
20	2					2	0
5	1					1	0
3	1					1	0
12	1					1	0
6	1					1	0

USK-maver

Slakteri:

Lev. nr.:

Slagtedato:

25	1					1	0
17						0	0

Graduering af maveforandringer og beregning af mavesårsindex.

Nedenstående tabel gælder kun for mavens hvide del, dvs. den del, hvor spiserørets indmunding findes.

Aktuelle forandringer

Forandring	Forklaring	Grad	Fund	Sår-index
Ingen forandringer	Mavens hvide del er hvid, glat og smidig.	blank/0	Mavens hvide del er hvid, glat og smidig	0
Forhorning	Slimhinden i mavens hvide del ændrer gradvis struktur (forhærdes) til fligede nydannelser.	1	Let grad < 1 mm	1
		2	Let grad 1-3 mm	2
		3	Papillomatose > 3 mm	3
Erosioner	Vævstab i slimhindens øvre lag. Nerver og blodkar er ikke beskadiget.	1	Erosion < ½ cm i diameter	4
		2	Erosion ½ - 2 cm i diameter	5
		3	Erosion > 2 cm i diameter	5
Sår	Vævstab i slimhindens dybere lag. Nerver og blodkar er blotlagt og evt. beskadiget.	1	Små overfladiske sår < ½ cm	6
		2	Mellemstore sår ½ - 2 cm eller mindre, hvis de er dybtgående	7
		3	Store sår > 2 cm eller mindre, hvis de er dybtgående	8

Afhelede forandringer

Forandring	Forklaring	Grad	Fund	Ar-index
Ingen forandringer	Mavens hvide del er smidig.	blank/0	Mavens hvide del er smidig	0
Ar	Ved heling af sår sker der en arvævsdannelse, der føles som en forhærdning af vævet og mavens hvide del bliver uelastisk.	1	En eller flere fibrøse strenge mærkes perifert	6
		2	Fibrøse strenge danner en næsten cikulær struktur, der kan være let eftergivende	7
		3	Fibrøse strenge danner en cikulær, fast struktur	8
Strikur	I de mest udtalte grader af forhærdningen, forsnævres spiserørets indmunding til en snæver uelastisk åbning.	1	Spiserørets diameter > ½ cm	9
		2	Spiserørets diameter ≤ ½ cm	10

Betydningen af forandringerne for grisenes velfærd og produktivitet er usikker, da der mangler forskning på området. Med vore farvekoder har vi forsøgt at komme med et bud. Det skal understreges, at det ikke er baseret på eksakt forskning.

Grøn: Normale eller tilnærmelsesvis normale anatomiske forhold.
 Gul: Lette forandringer, der kan være forstadier til større forandringer.
 Orange: Mellemstore forandringer.
 Rød: Udtalte forandringer.