

H12 - Opsamlingsso til pattegrise med nedsat trivsel



Sulten gris som bør flyttes til en opsamlingsso

Det kan ikke undgås, at der forekommer grise, som falder fra i forhold til resten af kullet. De kan med fordel flyttes til en opsamlingsso.

1. Opsamlingssoen skal passe de pattegrise, der ikke kan klare sig i deres oprindelige kuld.
2. Opsamlingssoen er en velfungerende so, der har fravænet egne ensartede og trivelige grise, der er flyttet i klimastalden.
3. Opsamlingssoen kan være en udsætterso.
4. Opsamlingssoen sættes 2 FEso ned.
5. Etablér opsamlingssoen, inden grisene bliver for utrivelige.
6. Hold øje med, at opsamlingssoen accepterer pattegrisene.
7. Pas på, at du ikke bruger opsamlingssoen til små, men sunde, grise.



Syg gris, der ikke bør flyttes

Det er ikke optimalt at

- Flytte en syg gris da den så vil smitte flere grise. I stedet skal den syge gris behandles, og det skal sikres, at den får mælk.
- Flytte sunde og raske grise, hvis de er små, men trivelige. Dette giver blot uro i patteorden i kullet, som de flyttes fra, og i kullet, som de flyttes til.
- Flytte en gris videre til endnu en opsamlingsso, hvis grisen ikke er klar til fravæning samtidig med de øvrige grise ved opsamlingssoen.

Pkt. Supplerende kommentarer - Opsamlingsso til pattegrise med nedsat trivsel	
1.	Få overblik over, hvornår der skal etableres en opsamlingsso. Sæt en tøjklamme på sotavlen hos de søer, hvor der er en gris med begyndende tegn på nedsat trivsel. Når der er brugt et antal tøjklammer, der svarer til det antal pattegrise, opsamlingssoen kan passe, etableres opsamlingssoen. Vær opmærksom på grise med nedsat trivsel, så det ikke bliver for sent at etablere opsamlingssoen. Se Bilag 14 - Opsamlingsso.
2.	Opsamlingssoen skal være en rask so i passende huld, uden skuldersår eller dårlige ben.
3.	En opsamlingsso kan være en udsætterso i passende huld. Der er risiko for, at en opsamlingsso kommer i brunst i farestalden, hvilket er uden betydning for holdstyringen når det er en udsætterso. Der er en produktivitetmæssig fordel i at bruge de yngre søer som ammesøer, og derved vil der sjældent være tilstrækkeligt antal unge søer til at kunne bruge disse som opsamlingssoer.
4.	Soens daglige foderration sænkes med 2 FEso for at undgå, at soen kommer i brunst, og for at undgå, at soen går i stå. Vær ekstra opmærksom på opsamlingssoens foderoptagelse, og på evt. udvikling af yverbetændelse de første dage efter etablering af opsamlingskudet.
5.	Især i første leveuge skal opsamlingssoen etableres hurtigt, da det ofte er sult, der gør, at pattegrisene får nedsat trivsel. Derefter er det primært som følge af sygdom eller dårligt fungerende pletter hos soen, at grisene skal flyttes til en opsamlingsso
6.	Hvis pattegrisene er urolige, og soen enten står meget eller ligger i bugleje efter et døgn, kan det skyldes, at opsamlingssoen ikke har accepteret kudet. Opsamlingssoen kan også være gået i stå. Det bør overvejes at bytte kudet med et andet kuld. Se H11 - Ombytning af kuld.
7.	Grise i et kuld kan godt have forskellig størrelse. Hvis grisene trives i deres oprindelige kuld, men bare er mindre end resten af kudet, skal de ikke flyttes.