

# Инструкция по выполнению инъекций

При вакцинировании поросят в виде инъекций, а также введении путем инъекций железа или антибиотика, важно использовать правильную технику укола.

## Правильная техника выполнения инъекции

Методика выполнения инъекции указана на этикетке пузырька с лекарством

- **в.м.:** означает укол в мускулатуру (внутримышечная)
- **п.к.** означает укол под кожу (подкожная)
- Используйте только те иглы, которые можно обнаружить (одобренные по стандарту Danish)
- Погнутые иглы сразу же **выбрасывайте**
- Обсудите технику укола и гигиену с вашим ветеринаром

## Правильный размер игл

- Подсосные поросята: 0,9 мм x 13 мм (20G)
- Поросята: 1,2 мм x 20 мм (18G)
- Откормочные свиньи: 1,6 мм x 25 мм (16G)
- Свиноматки: 1,6 мм x 38 мм (16G)

## Необходимо менять иглу

- После выполнения инъекций в каждом помете подсосных поросят, например, после введения железосодержащих препаратов
- После каждых 10-15 лечений поросят или откормочных свиней
- После одного или двух лечений свиноматок

## При сломанных иглах

- Пометьте свинью специальной ушной биркой на той же стороне, где осталась сломанная игла (для получения дополнительной информации см. инструкцию)
- Сообщите перевозчику
- Сообщите на бойню


## Персональная безопасность

При контакте с антибиотиками существует риск аллергии. При работе с антибиотиками надевайте перчатки или мойте руки.

**Свинью с поломанной иглой можно на законных основаниях отправлять на бойню, получившую об этом уведомление**

**Не забывайте, что свиней следует метить ушными бирками**

- Danish Crown высылает щипцы и ушные бирки, тел. 89191920
- Tican высылает ушные бирки, тел. 99192310



Инъекция антибиотика в шейную мускулатуру  
ВМ = внутримышечная инъекция



Различные размеры игл



Укол в шейную мускулатуру