

H3A - Egen produktion af polte indtil 60 kg

Optimal håndtering af sogrisene fra fødsel til 60 kg giver en tilstrækkelig pulje af polte af god kvalitet ved 60 kg.

1. Polte i farestalden

- Utrivelige sogrise udvælges ikke
- Øre/randklip sogrisene med moderens sonummer eller fødselsuge
- Sæt plaster på de forreste patter på sogrisen
- Ved fravæning skal kun de stærke sogrise med minimum 14 patter øremærkes

2. Polte i fravænningsstalden

- Poltene skal have plads, der minimum svarer til lovkravet
- Poltene opstaldes så de kun går sammen med andre polte
- Tilse stien med polte to gange dagligt
- Vurder polte minimum to gange fra fravæning til 60 kg

3. Polte fra 30 til 60 kg

- Poltene opstaldes i separate stier
- Opstaldes så arealet som minimum overholder lovkravene
- Der skal laves kritisk selektion ud fra utrivelighed, forkert benstilling, brok, fejl ved klove og sadelleje én gang ved 60 kg eller ved flytning
- Sammenhængen mellem vægt og alder vurderes



Forreste patter dækkes med plaster for at undgå skader

Sammenhæng mellem alder og vægt

Alder, dage	80	96	108	122	136	150	164	178	192	206	220	234
Vægt, kg	30	38	47,5	57,5	68	79	90	101	111	121	130,5	141

Ved fødsel forventes som udgangspunkt 7 polte (sogrise) pr. kuld
Forventet antal polte ved 60 kg:

- Frafald fra fødsel til fravæning på 30-40 %
Forvent 4,2-4,9 polte pr. kuld ved fravæning
- Frafald fra fravæning til 30 kg på 2,5-6,0 %
Forvent 4,0-4,8 polte pr. kuld ved 30 kg
- Frafald fra 30 kg - 60 kg på 1,7-4,0 %
Forvent 3,8-4,7 polte pr. kuld ved 60 kg

Kommentarer til H3A - Egen produktion af polte indtil 60 kg

1. Undlad at udvælge og mærke utrivelige sogrise.

Det er vigtigt, at pattegrisen vurderes på, hvor mange patter den har, da det giver mulighed for at fravænne flere grise, når den bliver so. Fødselsvægten er mindre vigtig, da der ikke ønskes polte med en høj tilvækst.


For at reducere slidskader på pattespidserne sættes et hæfteplaster på de forreste patter ned til navlen. Navlen må ikke dækkes. Normalt falder plasteret selv af eller fjernes på 2.-3. dagen.

Øre/randklip sker efter følgende model: (se billede)

Senest ved fravæning mærkes polten med et rundt polteøremærke med poltens eget 4-cifrede ID-nummer. På øremærket er desuden besætningens 3-cifrede besætningsnummer.

ID-nummeret kan oprettes i AgroSoft til brug ved kernestyling og giver overblik over poltepuljen. Øremærker bestilles gennem DanAvl.

Der kan ligeledes anvendes kaninøremærker, som isættes ved fødslen, så kuldudjævning kan foretages som normal praksis.



2. På grund af forskel i temperament og adfærd anbefales det, at polte efter fravæning går i stier for sig selv og ikke blandes med 3-race-krydsningsgrise.

Kuldsøskende inklusive orne- og galtgrise kan om nødvendigt gå sammen med poltene.

Placer poltene, hvor der er størst mulighed for tilsyn/opsyn/menneskekontakt. Positiv kontakt med poltene er altafgørende for at sikre, at dyrene bliver omgængelige og fortrolige med mennesker.

Minimum to gange mellem fravæning og 60 kg skal der foretages en kritisk frasortering af polte, der ikke egner sig til at blive søer. Frasorteringsårsag er utrivelighed, forkert benstilling, brok, fejl ved klove og sadelleje.

3. Anbefalingerne til areal:

- 30-50 kg er 0,4 m² pr. gris (lovkrav)
- 50-110 kg er 0,75-1 m² pr. gris

Erfaringen er, at LY/YL-polte kan være mere aggressive end LYD grise, hvilket kan give anledning til halebid m.v. Opstår disse problemer kan ekstra areal afhjælpe det.