

10 BUD

Nedsæt risikoen for brok

Få kendskab til, hvor mange smågrise med brok du har i din besætning. Gennemgå alle smågrise ved salg eller flytning til slagtegrisestalden, og optæl antallet af grise med brok. Sæt dette antal i forhold til, hvor mange smågrise du har på stald, og udregn en procent. En dansk undersøgelse har vist, at den gennemsnitlige andel af smågrise med brok er 2,9 % (1,0 %-5,3 %).

Sæt fokus på farestien

1

Farestien skal være ren og tør under og efter faring

- Skrab stien ren jævnligt
- Strø med moderate mængder savsmuld eller kartoffelmel evt. iblandet et desinfektionsmiddel i og foran pattegrisehulen

Sæt fokus på faringen

2

Gør hvad du kan for at sikre lette faringer

- Sørg for rigelig vand til søerne
- Undgå forceret træk i grisene i forbindelse med fødselshjælp

Sæt fokus på pattegrisen

3

Sørg for rigelig råmælk til alle pattegrise

4

Afkort navlesnoren, når den er tør

- Afkort navlesnoren til minimum 3 cm
- Saksen skal desinficeres mellem hver gris

5

Desinficer navlestedet med klorhexidinsprit eller jod-sprit

6

Når grisene skal håndteres, løft dem ved at holde under maven

- Klem ikke grisen på maven under kastration

7

Minimer flytning af grise mellem søer

8

Forebyg diarre og hoste blandt pattegrisene

9

Hold ekstra øje med disse risikogrise, og behandl dem efter dyrlægens anvisninger

- Umodne grise
- Grise med et rødt og hævet navlested
- Små, utrivelige grise

10

Nogle besætninger har gavn af at sætte bandage over navlen på de pattegrise, hvor brok kan skubbes tilbage i bughulen

- Husk at skifte bandage hyppigt

