

# Грыжа:

## десять советов для уменьшения риска

1

Станок для опороса должен быть продезинфицирован и высушен

3

Сделайте все возможное, чтобы облегчить опорос

5

Укорачивайте пуповину максимум на три сантиметра. В отрасли нет единого мнения о том, какую пуповину лучше подрезать - мокрую или сухую. Лучше всего укорачивать пуповину пережиганием, при этом не спешите и не отрывайте пуповину. При использовании ножниц их необходимо дезинфицировать после каждого поросенка

7

После укорачивания пуповины наложите на нее пластырь

9

Не сдавливайте живот поросенка во время кастрации

2

По всему станку должна быть выложена солома в качестве мягкой подстилки

4

Обеспечьте умеренное количество древесных опилок или картофельной муки, возможно, в смеси со сталосаном Ф (Stalosan F®) или другим дезинфицирующим средством, в домике для поросят

6


Продезинфицируйте пупок спиртовым хлоргексидином или спиртовым йодом. Можно также использовать Цикло Спрей или другой спрей с антибиотиком, но не забудьте зарегистрировать его как антибиотик

8

Поднимайте и опускайте поросенка в станок, держа его под животом, и не зажимайте его

10

Обеспечьте всем поросятам достаточное количество молока и избегайте появления у них диареи и кашля



[svineproduktion.dk](http://svineproduktion.dk)