Skema til kontrol af sigteprofil

Bygholm 2 sigten - Slagtesvin og smågrise



Brugsanvisning:

Formalingsgraden kontrolleres hver 14. dag

1. Udtag en kornprøve af hver kornart og lad den køle inden sigtning
2. Fyld kornprøven i det store rum og ryst det let sammen, så det passer med stregen
3. Sæt låget i
4. Ryst i 2 minutter
5. Anbring sigten med låget opad og ryst sigten forsigtigt, så materialet bedst muligt udjævnes i de enkelte rum
6. Aflæs materialehøjden i de enkelte rum og beregn procentfordeling. Eks.:

Eksempel	**Under 1 mm**	**1-2 mm**	**Over 2 mm**	**Sum**
Aflæsning	72	24	0	96
Beregning	72 x 100 / 96 %	24 x 100 / 96 %		
Procentfordeling	75 %	25 %	0 %	100 %

Smågrise og slagtesvin udnytter foderet optimalt når det formales fint. Eneste årsag til at overveje en grovere formaling er, hvis der opstår mave-tarm-problemer eller endetarmsudfald. I praksis er det forholdene i den enkelte besætning, der afgør den optimale sigteprofil. Læs mere om formalingsgradens effekt på produktivitet og mavesundhed, samt om at justere sigteprofilen til den enkelte besætning på *vsp.lf.dk*.

Dato	**Resultat af sigteanalyse**					Bemærkning	Dato for skift af sold og slagler
	Under 1 mm	1-2 mm	Over 2 mm	Hele kerner? (Ja/Nej)	Avner/skaller over 2 mm? (Ja/Nej)		
VSP	**Mindst 60 %**	**Højest 40 %**	**0 %**	**Nej**	**Nej**		