

Fravænning uden zink

Erfaringer fra staldgangen

Produktion:

- 535 årssøer.
- 17.000 30'kgs.
- 15.000 slagtesvin.
- 7 medarbejdere.
- Indkøbt færdigfoder.



Hvorfor er vi gået i gang med at udfase zink?

- Vi ved vi skal gøre det på et tidspunkt.
- Vi har en stabil produktion med rutineret personale – derfor er det muligt at forsøge sig med udfasning af zink



Produktionstal:

Med zink (2. kvartaler)

- 500 gram daglig tilvækst
- 1,57 FE/kg tilvækst
- 2,8 % døde
- 32 diegivningsdage

Uden zink (2. kvartaler)

- 485 gram daglig tilvækst
- 1,68 FE/kg tilvækst
- 2,5 % døde
- 32 diegivningsdage

Daglige rutiner

- 6 fodringer i farestalden om dagen. Ca. 630 gram i diegivningsperioden.
- I klimastald sortering efter størrelse
- 2 gange daglig vanding ved ny fravænnede
- Management vigtigt
- Fodring efter størrelse




Foder

- 3 slags foder i klimastald
 - Danish New Wean 141+11+22+7+9
 - Danish Grow SM 241+11+22+3+9
 - Danish Grow SM 244+3
- 1 blanding i slagtesvin
- Ca. 6 kr. dyrere i indkøb pr gris.
- Ny foderstrategi



Foderstrategi

■ Blanding 1 ■ Blanding 1+3 ■ Blanding 1+2 ■ Blanding 2 ■ Blanding 2+3 ■ Blanding 3



Medicinforbrug

- Medicinering nødvendig
- Mindre mængde antibiotika
- Andre sygdomme påvirker



Konklusion

- Vi har ikke løsningen endnu, men får løbende erfaringer
- Giver udvikling af medarbejdere
- Robuste grise er nemmere
- Styr på sygdomme er vigtigt
- Nye foderstrategier er mulige
- Påvirkning hos slagtesvin?

