



DYREVELFÆRD I HANGRISEPRODUKTIONEN


**Stud.med.vet. og Studentermedhjælper
Kasper Pedersen, Husdyrinnovation**

**Fagligt Nyt, Fredericia
18. september 2018**

PRODUKTION AF HANGRISE

Hangrise 2017: **355.520 stk.** (= 2,0 % af total)


1. kvartal 2018: **103.338 stk.**



Hangris eller galtgris?

- ✓ *Mindre arbejdsindsats*
- ✓ *Bedre foderudnyttelse*
- ✓ *Højere kødprocent*
- ✓ *Bedre omdømme*

- ÷ *Frasortering*
- ÷ *Kødkvalitet*
- ÷ *Sværskader*




1. Hvad siger litteraturen?
2. Hvad siger nuværende producenter af hangrise?
3. Hvad siger slagteanmærkninger?

HANGRISE OG DYREVELFÆRD - TIDLIGT I LIVET

Hangrise undgår:

- Smerten i kastrationsøjeblikket
- Stress ved håndtering
- Følgesygdomme og eventuel død
(0,7 %, jf. meddelelse nr. 984)




HANGRISE OG DYREVELFÆRD - SENERE I LIVET

Hangrise begynder kønsmodning efter en alder på cirka 17 uger afhængig af vægt og miljø.

Litteraturen siger:

1. Øget aktivitet
2. Aggressiv adfærd
3. Jager rundt med andre grise
4. Ridning
5. Uønsket drægtighed
6. Penisbid
7. Skubber andre grise væk fra vand- og ædetrug
8. Rangkampe
9. Mindre renlige



HANGRISE OG DYREVELFÆRD - SENERE I LIVET



- Hierarki er vigtigt
 - Undgå sammenblanding
 - Udleveringsstrategi



HANGRISE OG DYREVELFÆRD

- SENERE I LIVET

Landmand 1, nyopstartet

1. Mere aktive og springer
2. Øgede andel benbehandlinger ved hangrisene
3. Mindre renlige

Landmand 2, 13 års erfaring:

1. Springer på hinanden
2. Øget dødelighed grundet benproblemer – afhjulpet
3. Sultne
4. Mindre renlige
5. Sammenblander grise

Landmand 3, 10 års erfaring:

1. Springer på hinanden
2. Sultne
3. Mindre renlige
4. Sammenblander grise
5. Størrelsessorterer

Ses ikke:

- Aggressivitet
- Jager rundt med andre grise
- Penisbid?
- Rangkampe
- Uønsket drægtighed

HANGRISE OG DYREVELFÆRD - SIDST I LIVET

Slagterianmærkninger

	Galte- besætninger	Hangrise- besætninger
Sogrise	6,20 %_a	6,70 %_b
Galte	7,30 %	-
Hangrise	-	9,90 %
Grise med anmærkninger	6,70 %_a	8,40 %_b
Antal grise	1.677.410	286.739

Hangrise:

- Bylder: 1,6 %
- Hudlæsioner: 0,9 %
- Knoglebrud: 0,2 %

Meddelelse nr. 1119

HANGRISE OG DYREVELFÆRD - HELE LIVET


Konsekvenser ved hangriseadfærd

Landmænd:

- Benskader (øgede antal behandlinger)
- Øget dødelighed af behandlede hangrise
- Penisbid?

Slakteri:

- Bylder
- Hudlæsioner
- Knoglebrud



OPNÅ BEDRE DYREVELFÆRD HOS HANGRISE - MINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF BESØG

- ✓ Kønsortering / Størrelsessortering
- ✓ Nok plads ved truget og evt. færre udfodringer
- ✓ Rene stier og udleveringsforhold
- ✓ Nok ventilation og gulvudsugning
- ✓ Rode- og beskæftigelsesmateriale



BEDRE DYREVELFÆRD HOS HANGRISE

ANDRE RÅD FRA LANDMÆNDENE

- ✓ **Opmærksom på enkeltdyrsbehandlinger**
- ✓ **God tilvækst**
- ✓ **Foderoptagelse**
- ✓ **Ikke for tunge grise ved levering**
- ✓ **God sundhedsstatus**



TAK FOR DENNE GANG

Mere nuanceret debat?



Bedre rustet til at kunne rådgive fremtidens hangriseproducenter.



SPØRGSMÅL?

TAK og husk!

Vær altid opdateret på den seneste faglige viden

Tilmeld dig **Nyhedsmail** fra
SEGES Svineproduktion på
www.svineproduktion.dk



 facebook.com/SegesSvineproduktion