



## ГИГИЕНА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ НАД ЭСТРУСОМ И ОСЕМЕНЕНИЕМ

Соблюдение гигиены в секции осеменения является необходимым условием для достижения высокого и стабильного процента опороса и оптимального размер помета.

Бактерии встречаются в наружной части влагалища свиноматки и на ваших руках. Абсолютная стерильность при работе невозможна, но перенос инфекции необходимо свести к минимуму.

### СПАРИВАНИЕ МОЖНО ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО В ПЕРИОД АКТИВНОЙ ТЕЧКИ

Найдите все свиноматки с признаками течки с помощью сокращенного плана из пяти пунктов\*. Не проверяйте консистенцию слизи во избежание передачи инфекции от свиноматки к свиноматке.

После стимулирования полового возбуждения признаки активной течки у свиноматки проверяются, сидя на ее спине. Если свиноматка принимает попытку ее оседлать, можно проводить осеменение. Спаривайте свиноматок только с признаками активной течки. Спаривание свиноматки вне периода активной течки не даст супоросности и может привести к заражению матки, что также может повлиять на плодовитость при следующем спаривании.



Обеспечьте чистое и сухое ложе с хорошей подстилкой, чтобы во время осеменения свиноматка была чистой.



Если половые губы (половая петля) грязные, их можно высушить чистым полотенцем.

### ГИГИЕНА ПРИ ОСЕМЕНЕНИИ

Следующие общие рекомендации помогут уменьшить риск переноса инфекции:

1. Обеспечьте чистое и сухое ложе с хорошей подстилкой, чтобы во время осеменения свиноматка была чистой.
2. Если половые губы (половая петля) грязные, их можно высушить чистым полотенцем.
3. Храните сперму, катетеры и, желательнее, перчатки и салфетки упакованными так, чтобы на них не попадали пыль и брызги.
4. Не следует осуществлять очистку под высоким давлением, когда в секции находятся свиноматки. Это может привести к распространению капельной инфекции.
5. Если при осеменении вы используете перчатки, надевайте их после проверки течки.
6. Прикасайтесь только к крайним 10 см катетера после того, как надорвете защитный чехол.
7. Раздвигайте половую петлю одним пальцем, держа за сухую часть одной половой губы.
8. Вводите слизистую пробку в половую щель так, чтобы она не прикасалась к сухой части половых губ.



Храните сперму, катетеры и, желательнее, перчатки и салфетки упакованными так, чтобы на них не попадали пыль и брызги.

\* см. [vsp.lf.dk](http://vsp.lf.dk)