

AFMÅL ML ANTIBIOTIKA TIL BEHANDLING



HÆLD ANTIBIOTIKAOPLØSNING I KRYBBEN LIGE FØR FODRING



ANTIBIOTIKA KAN TILSÆTTES I NEDFALDRØRET MED MEDLIQ®



Brug af antibiotika ved vådfoder

Flokbehandling skal gives direkte i krybben i vådfoderbesætninger. Der må ikke blandes antibiotika i vådfoderanlægget.

MULIGHEDER FOR FLOKBEHANDLING VED BRUG AF VÅDFODER

Antibiotikaopløsning kan gives stivis med:

- Spand
- Medliq® (tilsætning via nedfaldsrør)
- Vogn med tank og pumpe eller lignende

FREMGANGSMÅDE

1. Antal grise pr. krybbe og deres vægt bruges til beregning af den mængde antibiotika, der skal bruges.
2. Mål antal liter vand, der skal til for at opløsningen fordeles i hele krybben.
3. Lav en antibiotikaopløsning ved at blande beregnede mængde antibiotika med vandet.
4. Brug en ren spand eller vogn.
5. Hæld denne antibiotikaopløsning i krybben lige før fodring.

MEDLIQ® TILSÆTNING VIA FODERRØR

– FREMGANGSMÅDE

1. Lav en antibiotikaopløsning, der passer til det antal grise, der skal behandles en dag
2. Kontroller at beholderen er tom næste dag.
3. Rengør beholderen, når behandlingen er slut.

PERSONLIG SIKKERHED

Der er risiko for allergi ved kontakt eller indånding af antibiotika. Brug handsker og maske ved håndtering af antibiotika.

➔ Krydsoverensstemmelseskrav (KO) til behandling med antibiotika i foderet:

- Der må **ikke** blandes antibiotika i vådfoderblanderen.
- Foder med antibiotika må ikke transporteres i foderanlægget.
- Husk at overholde slagtefristen efter antibiotikabehandling.