

Использование антибиотиков в сухих кормах

Групповое лечение можно проводить посредством скармливания корма. Запрещается смешивать антибиотики в кормосмесителе или в системе кормораздачи.

Доза антибиотика для лечения рассчитывается исходя из

- количества свиней на кормораздатчик
- веса свиньи
- кг сухого корма, пожираемого в сутки из одного фидера

Смешивание антибиотиков с сухим кормом

- Используйте бетономешалку или тележку для корма
- Бетономешалка и тележка должны иметь отчетливую маркировку "Только для корма с антибиотиками"
- Смешивайте антибиотик с кормом тщательно и равномерно

Лечение антибиотиками посредством сухих кормов

- Корма с антибиотиками следует подавать в раздатчиках только в тех станках, где будут подвергнуты лечению
- Корма с антибиотиками можно давать на твердом полу

Персональная безопасность

- Существует риск аллергии при вдыхании антибиотиков или контакте с ними
- При смешивании антибиотиков с кормами используйте перчатки и маску
- Кроме того, рекомендуется носить маску при раздаче кормов, содержащих антибиотики
- Ограничивайте распыление при смешивании антибиотика с кормом – накрывайте бетономешалку крышкой

Соблюдение системы норм, необходимых для получения помощи от ЕС, при лечении антибиотиками в кормах:

- **Запрещается** смешивать антибиотики в кормосмесителе
- Корма с антибиотиками **запрещается** транспортировать в системе кормораздачи
- Не забывайте соблюдать предубойный период откорма после лечения антибиотиками



Взвешивайте порошок антибиотика, используя маску и перчатки.



Смешивайте антибиотик с кормом особо тщательно.



Тележка для корма должна иметь маркировку "Только для корма с антибиотиками"



Давайте корм с антибиотиком только тем свиньям, которые нуждаются в лечении