

FODERVOGNE MED FRAVÆNNINGSBLANDING OG EKSTRA FRAVÆNNINGSBLANDING SIKRER GRADVIST FODERSKIFTE.



GRADVIST FODERSKIFTE VED BRUG AF TO FODERSTRENGE SAMT MULIGHED FOR MANUEL FODRING I AUTOMATER.



Foderskifte uden diarré

Formål med at skifte "gradvist" mellem to foderblandinger er at tilvænne grisene til den efterfølgende blanding og derved modvirke diarré.



Korrekt brug af medicinsk zink (KO-krav):

- Sandsynliggør (skriftligt), at der ikke sker væsentligt overslæb af medicinsk zink til den efterfølgende blanding – spørg din foderrådgiver om, hvordan du gør dette?
- Inspicér blanderen for restmængde hver gang, der har været blandet foder med medicinsk zink.

DET GRADVISE FODERSKIFTE

- Et gradvist foderskifte skal strækkes over mindst 4-5 dage – se figur.
- De to blandinger skal blandes. Det er ikke tilstrækkeligt at udfodre den ene blanding i automat og den anden blanding i trug eller på gulvet.

TILVÆNNING TIL SOJASKRÅ, MENS GRISENE FÅR MEDICINSK ZINK

- Fravænningsfoder med medicinsk zink må kun anvendes 0-14 dage efter fravænnning.
- Overgangen fra fravænningsfoder (med zink) til smågrisefoder (uden zink og mere sojaskrå) kan give grisene diarré. Hvis dette er tilfældet, kan ét af følgende forsøg afprøves:

1

- En ekstra vogn til blanding 2 med medicinsk zink
- Aftal med besætningsdyrlæge omkring dosering og anvisning af brugen af medicinsk zink
- Ibland medicinsk zink i blanding 2 i en fodervogn
- Brug denne vogn til fodring af de grise, der indenfor 0-14 dage efter fravænnning skiftes fra fravænningsfoderet over på blanding 2
- 14 dage efter fravænnning skiftes til blanding 2 uden tilsat medicinsk zink

2

- En ekstra fravænningsblanding
- Der anvendes en ekstra fravænningsblanding med 5-10 pct. sojaskrå og medicinsk zink som overgangsblanding til blanding 2.
- De store grise kan evt. fravænnes direkte på denne billigere blanding.
- 14 dage efter fravænnning skiftes til blanding 2 uden tilsat medicinsk zink.

x



Foderskifte sker brat. Grisen når ikke at tilvænne sig til det nye foder med øget risiko for diarré.

✓



Foderskifte sker gradvist over en længere periode. Grisen mærker ikke foderskiftet.