

## H10D - Levneliste, ESF

Levnelisten indeholder de dyr som ikke har ædt hele deres foderration.  
Listen skal gennemgås hver dag, og alle dyr på listen skal vurderes og håndteres.

### Eksempel på oplysninger på levnelisten

1	2	3	4	5	6	7	8	9
So nr. / responder nr.	Sti eller stationsnr.	Cyklus-/ Drægtighedsdag	Foder- kurvenr.	Ration iflg. kurve, FEso eller kg	Aktuel ration*, FEso eller kg	Ædt i <u>dag</u> , FEso eller kg	Ædt i <u>går</u> , FEso eller kg	Ædt i <u>forårs</u> , FEso eller kg

\* Angiver om der praktiseres overførsel af ration fra et døgn til det næste.

### Kontrollér, at alle søer har ædt deres ration

- Udskriv aktuel levneliste hver dag lige før den skal bruges:
  - a) Tidligst 14 timer efter foderdøgnets start.
  - b) Senest 1-2 timer før arbejdstids ophør, dog så der stadig er tid til tage affære.
- Kriteriet for at komme på levnelisten er, at søerne mangler at æde 25 % eller mere af dagsrationen.
- Få overblik over listen. Der bør maksimalt være 2 % af dyrene i drægtighedsstalden som ikke har ædt. Tjek hvor mange søer, der har levnet i forhold til de foregående dage - over en uge må antallet ikke øges
- Tjek hvilke søer, der har levnet dagsration:
  - a) Går de alle sammen i samme sti? - Hvor er de i cyklus? - Hvilken foderkurve er de på?
- Tag listen med ud i stalden hver dag, find søerne - og hjælp dem igennem en foderstation eller flyt dem i sygesti.

### Mange søer på levnelisten kan have forskellige årsager og kræver altid handling

Mulige årsager	Handling
Mange nyindsatte søer	Sørg for mest mulig ro i drægtighedsstalden.
Utilstrækkelig træning	Gennemgå og vurder træningsforløb for polte og gylte
Angst for foderstationen eller lågerne	Kontrollér hastigheden på indgangslågerne Øget fokus på træningsforløbet af poltene
Fejl ved indgangslåge eller krybbeklap	Observér og justér indgangslåge og krybbeklap
Stop eller delvis stop i udfodringen	Tilse foderstationen og foretag nødvendige justeringer Tjek om det kan skyldes brodannelse
Søer der er flyttet til farestalden/sygesti/løbestald er ikke taget ud af programmet	Opdatér dataforholdene efter den aktuelle opstaldning på individniveau
Øremærker, der ikke virker eller er tabt	Kontroller ved hjælp af øremærkelæser aktuelle øremærker
Benproblemer	Flyt til sygesti! Vurder belægningsgraden og skridsikkerhed i stien samt fodersammensætningen Tjek om der er inventardele der kan skade søerne
For stor fodermængde	Justér foderkurven så et lille dyr sidst i drægtigheden stadig kan rumme fodermængden Overførsel af foder til næste døgn anbefales ikke
Dårligt smagende foder	Vurdér foderets udseende, lugt og smag og få evt. foretaget en analyse. Rens foderstationerne og -rør.

## Kommentarer til H10D - Levneliste

- Kolonne 1:** Man skal kunne identificere dyret

**Kolonne 2:** Man skal hurtigt kunne se, hvor dyret er placeret i stalden

**Kolonne 3:** Er dyret lige indsat eller evt. udgået til farestalden.

**Kolonne 4:** Angiver hvilken foderkurve er dyret sat på

**Kolonne 5:** Angiver hvor meget dyret tildeles i forhold til foderkurven d.d.

**Kolonne 6:** Angiver hvor meget dyret tildeles inklusive overført foder og procent korrektion. (Ved vådfoder kan det være godt at se, hvor stor en mængde de givne FEso fylder). Hvis der mod anbefalingerne overføres foder fra et døgn til det næste, kan man se dette her (for stor mængde kan være årsagen til dyret levner).

**Kolonne 7, 8, 9:** Angiver hvor meget foder det enkelte dyr har levnet de sidste tre dage?
- Det er vigtigt at udskrive den aktuelle Levneliste *dagligt*.**

Fokus rettes mod søer, der ikke har ædt i det aktuelle og det foregående foderdøgn.

Vær opmærksom på, hvilke indstillinger og kriterier, der ligger til grund for at komme på Levnelisten.

  1. Det optimale kriterium er, at alle søer, der mangler at æde mere end 25 % af foderrationen, medtages på levnelisten. Dette er kun muligt hos enkelte fabrikater.
  2. Nogle fabrikater sætter søer på Levnelisten, hvis de mangler et givent antal FEso. Her bør vælges 0,5 FEso/dag - men vær opmærksom på, at det er et kompromis.

Det er ikke hensigtsmæssigt at overføre restfodermængde fra tidligere døgn, fordi foderkurven er tilpasset soens behov. Når levnelisten tjekkes dagligt, vil det sløre overblikket, hvis der indgår foder fra dagen før.

**Få et overblik over listen**

Er der lige indsat mange nye dyr, skal der dannes en ny rangorden, og levnelisten kan være lidt længere. Er listen pludselig lang, kan der også være tekniske fejl ved stationen eller fodermangel m.m.

Det vil sige: Skab dig et kvantitativt overblik over dyrene, der levner samt deres placering i stalden.

Hvis det er muligt, så sorter søerne på levnelisten efter cyklusdage og/eller stinr. og/eller foderkurve.

Går hovedparten af dyrene på levnelisten i samme sti, er der højst sandsynlig noget galt med en eller flere foderstationer i denne sti. Det kan være åbne/lukkemekanismen på indgangslågen eller krybbeklappen, kagedannelse eller fejl ved uddoseringsenheden.

Nyindsatte dyr kan springe 1. dag over, fordi de lige skal vænne sig til at bruge stationen igen, og have rangkampene overstået.

Hvis mange højdrægtige søer levner, kan foderkurven være sat for højt, og/eller der er for høj belægning, at de ikke får adgang til stationen, før de er blevet trætte af at vente.

Ved vådfodring kan for stor en vandmængde være årsagen til at f.eks. unge søer levner.

Det vil også fremgå af levnelisten, hvis du har "glemt" at afmelde søer, der er udtaget til fx farestalden, i styreprogrammet.
- Efter vurderingen af søerne på levnelisten tages levnelisten med ud i stalden. De nævnte søer findes i flokken, raske søer ledes til foderstationen, syge og tilskadekomne søer flyttes til sygesti.